

Aula 00 - Profa. Ligia

*TSE - Concurso Unificado (Analista
Judiciário - Enfermagem) Sprint final de
Questões - 2024 (Pós-Edital)*

Autor:

**Breno da Silva Caldas Júnior,
Guilherme Gasparini, Ligia
Carvalho Fernandes, Patrícia
Cristina Biazao Manzato Moises,
01 de Outubro de 2024
Thaysa Vianna**

SUMÁRIO

CEBRASPE / Instituto Hospital Base do DF / 2018.....	2
Questões comentadas pelo professor.....	2
Gabarito.....	20
Lista de Questões.....	20



CEBRASPE / INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DF / 2018

Questões comentadas pelo professor

1. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue o item a seguir.

A vacina quadrivalente papilomavírus humano (HPV recombinante) deve ser administrada exclusivamente por via subcutânea, no esquema estendido zero, seis e sessenta meses, podendo o paciente que a tome apresentar reações como dor no local da aplicação, edema e eritema de intensidade moderada.

() Certa () Errada

Comentários

Conforme mudanças recentes (veja o link ao final da resposta), houve adoção da dose única da vacina HPV no Calendário Nacional de Vacinação para pessoas do sexo feminino e masculino de 09 a 14 anos de idade, realização de estratégia de resgate de adolescentes até 19 anos não vacinados e inclusão das pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR), como grupo prioritário da vacina HPV.

Doses: dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos e três doses para imunodeprimidos e vítimas de violência sexual.

Via: IM.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-41-2024-cgici-dpni-svsa-ms>

Alternativa: Errada.

2. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue o item a seguir. A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue o item a seguir.

Uma única dose da vacina contra a febre amarela, produzida com vírus vivo atenuado, pode conferir eficácia entre 90% a 98% e proteção por toda a vida.

() Certa () Errada

Comentários

A vacina febre amarela é segura e eficaz, entre 90% a 98% das pessoas que foram vacinadas com uma única dose, a imunidade (efeito protetor) ocorre em torno de 10 dias após a aplicação e confere proteção por toda a vida.



A vacina é produzida com vírus vivo atenuado (enfraquecido), e propicia o desenvolvimento de níveis protetores de anticorpos contra a doença por toda a vida. Para que ocorra esta produção de anticorpos esse vírus enfraquecido se replica no organismo e em algumas pessoas pode ocasionar reações leves (eventos adversos) como dor no local onde foi aplicada a vacina, mal estar e febre.

Alternativa: Certa.

3. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca das modalidades assistenciais, julgue o item subsequente.

A modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares inclui procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, para o cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

() Certa () Errada

Comentários

Lei 10.424/2002 - Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

§ 1 Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

Alternativa: Certa.

4. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca das modalidades assistenciais, julgue o item subsequente.

Define-se regime de hospital-dia como assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de vinte e quatro horas.

() Certa () Errada

Comentários

Art. 2º - Definir como Regime de Hospital Dia a assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um PERÍODO MÁXIMO DE 12 HORAS.

Alternativa: Errada.

5. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às unidades de atenção à saúde mental, julgue o item seguinte.



O centro de atenção psicossocial (CAPS) na modalidade II é o que atende crianças e adolescentes somente entre dez e dezessete anos de idade, portadores de transtornos mentais graves e persistentes, inclusive decorrentes do uso de substâncias psicoativas, em cidades e(ou) regiões com pelo menos cem mil habitantes.

() Certa () Errada

Comentários

Vamos rever:

Segundo o MS, através da Portaria N 3.088, de 23 de Dezembro de 2011,

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades:

I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte mil habitantes;

II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes;

III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes;

IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes;

V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes; e

VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de cento e cinquenta mil habitantes.

Alternativa: Errada.

6. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às unidades de atenção à saúde mental, julgue o item seguinte.



Uma das diretrizes de serviço hospitalar de referência para a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas é a integração à rede de atenção psicossocial, para garantia da continuidade do cuidado.

() Certa () Errada

Comentários

PORTARIA Nº 148, DE 31 DE JANEIRO DE 2012

Art. 2º O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas é um ponto de atenção do componente Atenção Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial e observará as seguintes diretrizes:

I -função precípua de preservação da vida, visando criar condições para a garantia da continuidade do cuidado pelos outros componentes da Rede de Atenção Psicossocial;

II -integração à Rede de Atenção Psicossocial, como parte das demandas e fluxos assistenciais na Região de Saúde, potencializando ações de matriciamento, corresponsabilidade pelos casos e garantia da continuidade do cuidado;

Alternativa: Certa.

7. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Sabendo que a presença de incapacidades é o principal preditor de mortalidade, hospitalização e institucionalização em idosos, julgue o item a seguir, a respeito da assistência de enfermagem em gerontologia.

No planejamento de enfermagem, devem-se determinar os resultados que se desejam alcançar e as ações ou intervenções que deverão ser realizadas face às respostas da assistência prestada ao idoso, identificadas na etapa do diagnóstico de enfermagem.

() Certa () Errada

Comentários

No planejamento de enfermagem, que serve para traçar os cuidados que serão realizados e devem-se determinar os resultados que se desejam alcançar, com melhoria dos processos ou estabilização e as ações ou intervenções que deverão ser realizadas face às respostas da assistência prestada ao idoso, identificadas na etapa do diagnóstico de enfermagem, etapa essa que é responsável por identificar os problemas reais ou o de risco. Essa assistência segue as etapas do processo de enfermagem.

Alternativa: Certa.

8. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Sabendo que a presença de incapacidades é o principal preditor de mortalidade, hospitalização e institucionalização em idosos, julgue o item a seguir, a respeito da assistência de enfermagem em gerontologia.

A avaliação das atividades da vida diária é a primeira fase da avaliação cognitiva do idoso.



() Certa () Errada

Comentários

A avaliação funcional busca verificar, de forma sistematizada, em que nível as doenças ou agravos impedem o desempenho, de forma autônoma e independente, das atividades cotidianas ou atividades de vida diária (AVD) das pessoas idosas permitindo o desenvolvimento de um planejamento assistencial mais adequado.

As escalas das ABVD que se baseiam em informações dos pacientes e dos cuidadores e devem ser simples e de rápida avaliação, podendo ser utilizadas por todos os membros da equipe interdisciplinar. As escalas mais utilizadas para avaliação as ABVD no nosso meio são a Escala de Katz e o Índice de Barthel.

Alternativa: Certa.

9. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico, julgue o item subsecutivo.

Flebite e urticária são efeitos colaterais comuns da quimioterapia sistêmica.

() Certa () Errada

Comentários

Os efeitos colaterais comuns são:

- Náuseas e vômitos
- Perda de apetite
- Perda de peso
- Fadiga
- Queda do hematócrito
- Ressecamento das mucosas
- Pele seca, com alteração da cor
- Hematomas ou sangramentos
- Febre
- Queda de cabelo, etc.

Alternativa: Errada.

10. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico, julgue o item subsecutivo.

Na terapia nutricional enteral em pacientes oncológicos, cabe ao profissional enfermeiro orientar os familiares e(ou) cuidadores quanto aos procedimentos relativos à higiene da ponta da sonda — com algodão embebido em álcool — a ser adotados antes de cada administração de dieta.

() Certa () Errada

Comentários



Exatamente. Esse cuidado deve ser realizado na parte externa da sonda com bastante cuidado para não puxar a sonda. Isso evita infecções e problemas com a higiene da mesma.

Alternativa: Certa.

11. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico, julgue o item subsecutivo.

Não há contraindicação de contato entre pacientes oncológicos em processo de quimioterapia e pessoas portadoras de doenças transmissíveis.

() Certa () Errada

Comentários

Ao contrário! Há contraindicação de contato entre pacientes oncológicos em processo de quimioterapia e pessoas portadoras de doenças transmissíveis. Essa medida é indicada pois o paciente em tratamento quimioterápico possui uma diminuição de sua imunidade causada pela destruição de células de defesa do organismo que o medicamento faz, e por esse motivo, ele se torna mais suscetível a infecções transmissíveis que podem ser extremamente prejudiciais para esse paciente, causando até o óbito.

Alternativa: Errada.

12. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca de procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais vitais, julgue o item a seguir.

Com relação à frequência cardíaca, a ausência de pulso pode indicar uma oclusão arterial.

() Certa () Errada

Comentários

Claro que aqui tem-se somente uma mera hipótese, carecendo de diversas outras informações para tal conclusão. Em se tratando de oclusão arterial, por consequência, haverá ausência de pulso.

Tal questão foi muito criticada, exatamente pela falta de informações.

Alternativa: Certa.

13. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca de procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais vitais, julgue o item a seguir.

A verificação da temperatura corpórea superficial/periférica por via oral é contraindicada em pacientes que tenham realizado cirurgias na região ou que apresentem dificuldade de respirar.

() Certa () Errada

Comentários



Pode-se obter a temperatura corpórea superficial/periférica através das axilas, da cavidade oral ou timpânica, no entanto, especificamente na via citada e pelos motivos do enunciado, esta é evitada e opta-se por outra localidade, visto que o sinal vital pode ser essencial para a avaliação do paciente.

Alternativa: Certa.

14. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às recomendações de práticas seguras em cirurgia, julgue o item que se segue.

Uma mensuração inicial da concentração de gás carbônico expirado (capnografia) deve ser usada para confirmar o posicionamento correto de tubo oral e também a adequação dos agentes voláteis inspirados.

() Certa () Errada

Comentários

Os valores da capnografia vão de 35 a 45 mmHg, onde uma diminuição ou aumento da capnografia pode indicar diversas situações como diminuição / aumento da atividade muscular, hipotermia / hipertermia, choque hipovolêmico, hiperventilação / hipoventilação, além de outras como hipotireoidismo e até mesmo alterações de calibragem dos equipamentos.

O posicionamento correto do tubo endotraqueal pode ser confirmado, assim como a adequação da ventilação, pelo aspecto da FORMA DA ONDA (frequência, amplitude) e pela concentração do gás carbônico expirado fornecida pelo capnógrafo.

Alternativa: Errada.

15. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A demarcação da lateralidade deve ser feita no sítio operatório ou próximo a ele — sítios não operatórios não devem ser demarcados.

() Certa () Errada

Comentários

O local ou locais a serem operados devem ser demarcados. Em casos de lateralidade isso é particularmente importante, estruturas múltiplas (p.ex. dedos das mãos e dos pés, costelas) e níveis múltiplos (p.ex. coluna vertebral). A demarcação deve ser:

- no sítio operatório ou próximo a ele; sítios não-operatórios não devem ser demarcados.
- claramente visível, sem ambiguidades e feita com um marcador permanente para que a marcação não seja removida durante a preparação do sítio.
- feita, preferencialmente, pelo cirurgião que realizará o procedimento.
- concluída, preferencialmente, enquanto o paciente estiver alerta e acordado.

Alternativa: Certa.



16. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 mmHg e(ou) 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir.

O mecanismo mais comum da HA no idoso é o enrijecimento da parede arterial dos grandes vasos, que pode levar ao aumento predominante da pressão arterial sistólica, com manutenção ou queda da pressão arterial diastólica.

() Certa () Errada

Comentários

Pseudo-hipertensão, caracterizada por níveis pressóricos falsamente elevados, devido ao enrijecimento da parede arterial, que dificulta a oclusão da artéria. Podemos identificar esta situação com a Manobra de Osler que consiste em inflar o manguito até acima do nível da pressão sistólica e palpar a artéria radial. Nos pacientes que apresentam calcificação vascular a artéria permanece palpável (sinal de Osler positivo).

Alternativa: Certa.

17. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 mmHg e(ou) 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir.

A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) consiste no registro direto da pressão arterial durante doze horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e sono.

() Certa () Errada

Comentários

A Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) é um exame que permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial a cada 20 minutos, durante 24 horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais e também durante o sono.

Tem como objetivo analisar o comportamento da pressão arterial não somente durante a vigília e o sono, como também durante eventuais sintomas como tontura, dor no peito e desmaio. Além disso, possibilita a avaliação da eficácia do tratamento anti-hipertensivo.

Alternativa: Errada.

18. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.



Doenças diarreicas no primeiro ano de vida são comumente associadas a mamadeiras mal higienizadas e à ocorrência de contaminações de alimentos complementares.

() Certa () Errada

Comentários

Infecções de origem fecal-oral são responsáveis pela maioria dos episódios de diarreia neste início de transição alimentar. Assim, processos de educação em saúde, visando higiene e hábitos sanitários amenizam as ocorrências.

Alternativa: Certa.

19. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

A frequência respiratória considerada normal para crianças de doze meses a cinco anos de idade é entre trinta e sessenta movimentos por minuto.

() Certa () Errada

Comentários

As variações da frequência respiratória ocorrem em função da alteração do volume corrente e da necessidade de se manter a capacidade residual funcional (CRF). No período neonatal os valores normais variam de 40 a 60 respirações por minuto. Acima de 60 respirações por minuto é considerado taquipneia.

Relembre:

Frequência respiratória normal

De 0 a 2 meses - até 60 mrm

De 2 a 11 meses - até 50 mrm

De 12 meses a 5 anos - até 40 mrm

De 6 a 8 anos - até 30 mrm

Acima de 8 anos - até 20 mrm

Alternativa: Errada.

20. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

A diarreia por rotavírus é prevenida por vacina aplicada aos doze meses de idade e aos quinze meses de idade.

() Certa () Errada

Comentários



VORH

- Administrada preferencialmente aos 2 e 4 meses.
- Exclusivamente por VIA ORAL, na quantidade de 1,5ml com seringa apropriada.
- Observações Importantes
- Caso a criança regurgitar, vomitar ou cuspir, não se deve repetir.
- Não administrar em crianças com imunossupressão severa, invaginação intestinal ou malformações do trato gastrointestinal não corrigidas.

Alternativa: Errada.

21. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária entre dois anos de idade e seis anos de idade se correlaciona com diarreia crônica e baixo crescimento.

() Certa () Errada

Comentários

Isso ocorre devido o excesso de frutose que poderá causar irritação ao sistema gastrointestinal do paciente. Por esse motivo, as sociedades de pediatria recomendam a utilização de no máximo 1 copo de 200 ml de suco para as crianças por dia.

Alternativa: Certa.

22. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a principal causa da síndrome do desconforto respiratório.

() Certa () Errada

Comentários

A SDR é a afecção respiratória mais frequente no RN pré-termo, sendo mais comum nos RN prematuros com menos de 28 semanas de gestação, do sexo masculino, em filhos de mãe diabética e nos que sofreram asfixia ao nascimento.

A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a principal causa da SDR.

Alternativa: Certa.

23. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.



Enquanto a proteção oferecida pelo leite materno contra mortes por infecções respiratórias diminui com a idade, a proteção desse alimento contra mortes por diarreia se mantém constante nos primeiros dois anos de vida.

() Certa () Errada

Comentários

Corrigindo: Enquanto a proteção contra mortes por diarreia diminui com a idade, a proteção contra mortes por infecções respiratórias se mantém constante nos primeiros dois anos de vida. MS, saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar.

Alternativa: Errada.

24. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue o item que se segue.

Recomenda-se a realização de mamografia bianualmente para mulheres a partir dos quarenta anos de idade.

() Certa () Errada

Comentários

Guarde:

- Exame clínico das mamas a partir dos 40 anos;
- Mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, com intervalo máximo de dois anos entre os exames;
- Exame clínico das mamas e mamografia anual, a partir dos 35 anos, para mulheres do grupo de risco.

Alternativa: Errada.

25. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue o item que se segue.

Os sintomas de menopausa costumam ser mais severos em fumantes.

() Certa () Errada

Comentários

No climatério, as mulheres tabagistas sofrem com a ocorrência de sintomatologia mais acentuada, como no caso dos fogachos. Quando em uso de hormônios, normalmente necessitam do dobro da dosagem para obterem os benefícios desta terapêutica, se comparadas às não fumantes. Mulheres que usam hormônios e fumam têm um risco até dez vezes maior de apresentar infarto do miocárdio, tromboembolismo e acidente vascular cerebral.

Alternativa: Certa.



26. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue o item que se segue.

Entre os maiores fatores de risco para osteoporose está a menopausa tardia.

() Certa () Errada

Comentários

Para não confundir os fatores de risco:

OSTEOPOROSE: menopausa precoce.

CÂNCER DE MAMA: menopausa tardia e menarca precoce.

Alternativa: Errada.

27. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida, julgue o próximo item.

Quando o paciente com trauma cranioencefálico apresenta oito pontos ou menos na escala de Glasgow, considera-se grave o trauma.

() Certa () Errada

Comentários

A Escala de Coma de Glasgow avalia a reatividade do paciente mediante a observação de três parâmetros: abertura ocular, reação motora e resposta verbal.

Cada componente dos três parâmetros recebe um escore, variando de 3 a 15, sendo o melhor escore 15 e o menor 3, sendo que quanto menor, pior o prognóstico.

Alternativa: Certa.

28. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida, julgue o próximo item.

Situações pré-hospitalares envolvendo violência, abuso de drogas ou intoxicações devem ser avaliadas pelo método ACENA.

O método ACENA é descrito no SAMU como uma avaliação de segurança para o socorrista a qual envolve a análise dos arredores, se a vítima está portando armas, a expectativa de vítima quanto ao atendimento, avaliação do nível de consciência, se há conflito e crise naquele ambiente e observação dos sinais de abuso de drogas e álcool, dentre outros aspectos.

() Certa () Errada

Comentários

Veja:

A: arredores, a casa, armas, artefatos de drogas, aparência



C: Conflito, crise na rede social e familiar

E: equipe da cena e expectativas e receptividade da rede social e familiar do paciente

N: nível de consciência e sofrimento

A: álcool, agressividade e auto agressão.

Alternativa: Certa.

29. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida, julgue o próximo item. É obrigatória a aplicação da escala de Cincinnati após manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

() Certa () Errada

Comentários

A escala pré-hospitalar de Acidente Vascular de Cincinnati avalia:

- Primeiro comando : falar para o paciente SORRIR, mostrando os dentes. Resposta inadequada : assimetria facial .
- Segundo comando : falar para o paciente LEVANTAR BRAÇOS para frente por 10 segundos. Resposta inadequada : queda de um dos braços evidenciando fraqueza muscular .
- Terceiro comando : falar para o paciente FALAR FRASE SIMPLES. Resposta inadequada : dificuldade ou incapacidade de falar .

Alternativa: Errada.

30. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Julgue o item subsequente, considerando as normas brasileiras de acreditação de serviços de saúde.

Um fundamento atual da gestão em saúde é a gestão por processos, definida como forma de entender a organização como um sistema integrado, de áreas interdependentes.

() Certa () Errada

Comentários

Pode ser definida como a gestão de processos de uma condição ou doença que envolve intervenções na promoção da saúde, na prevenção da condição ou doença e no seu tratamento e reabilitação.

Alternativa: Errada.

31. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Julgue o item subsequente, considerando as normas brasileiras de acreditação de serviços de saúde.



A avaliação de uma organização prestadora de serviços de saúde pode levar a um dos seguintes resultados: acreditado com excelência; acreditado pleno; acreditado; não acreditado.

() Certa () Errada

Comentários

Nível 1 - Acreditado

A organização de saúde cumpre ou supera, em 70% ou mais, os padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA. São avaliadas todas as áreas de atividades da instituição, incluindo aspectos estruturais e assistenciais.

Certificado válido por dois anos.

Nível 2 - Acreditado Pleno

A organização precisa atender a dois critérios:

- 1) cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de qualidade e segurança;
- 2) cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades.

Certificado válido por dois anos.

Nível 3 - Acreditado com Excelência

A organização precisa atender a três critérios:

- 1) cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança;
- 2) cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada;
- 3) cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.

Alternativa: Certa.

32. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco, julgue o item subsecutivo.

O descolamento prematuro de placenta em grau 1 compromete a vitalidade do feto.

() Certa () Errada

Comentários

Uma forma de classificar o DPP baseia-se no grau de desprendimento da placenta. A separação pode ser parcial ou total e classificada em três graus, levando em conta os achados clínicos e laboratoriais, de acordo com classificação de Sher:

- grau 1: Sangramento genital discreto sem hipertonia uterina significativa. Vitalidade fetal preservada. Sem repercussões hemodinâmicas e coagulopatia. Geralmente diagnosticado no pós-parto com a identificação do coágulo retroplacentário.



- grau 2: Sangramento genital moderado e contrações tetânicas. Presença de taquicardia materna e alterações posturais da pressão arterial. Alterações iniciais da coagulação com queda dos níveis de fibrinogênio. Batimentos cardíacos fetais presentes, porém com sinais de comprometimento de vitalidade.
- grau 3: Sangramento genital importante com hipertonia uterina. Hipotensão arterial materna e óbito fetal.
- grau 3A: Sem coagulopatia instalada.
- grau 3B: Com coagulopatia instalada.

Alternativa: Certa.

33. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco, julgue o item subsecutivo.

Casos de abortamento infectado são mais associados a ocorrências espontâneas, decorrentes da falta de higienização regular.

() Certa () Errada

Comentários

O abortamento infectado com muita frequência está associado a manipulações da cavidade uterina pelo uso de técnicas inadequadas e inseguras. Estas infecções são polimicrobianas e provocadas, geralmente, por bactérias da flora vaginal. São casos graves e devem ser tratados, independentemente da vitalidade do feto. As manifestações clínicas mais frequentes são: elevação da temperatura, sangramento genital com odor fétido acompanhado de dores abdominais ou eliminação de secreção purulenta através do colo uterino. Na manipulação dos órgãos pélvicos, através do toque vaginal, a mulher pode referir bastante dor, e deve-se sempre pensar na possibilidade de perfuração uterina.

Alternativa: Errada.

34. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco, julgue o item subsecutivo. Casos de crescimento intrauterino restrito grave, diagnosticado no segundo trimestre de gravidez, sugerem possibilidades de cromossomopatia ou de infecção congênita.

() Certa () Errada

Comentários

Casos de CIUR grave e precoce (diagnosticado no segundo trimestre) apontam para a possibilidade de infecção congênita ou cromossomopatia. Nestes casos, uma avaliação morfológica fetal detalhada deve ser realizada, assim como, se possível, um cariótipo fetal.

Alternativa: Certa.



35. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue o item a seguir.

Em se tratando de funcionários que exercem atividades de limpeza, lavanderia e cozinha, considera-se a candidíase uma doença laboral caracterizada, por meio da história ocupacional dessas pessoas e da inspeção no ambiente de trabalho, a exposição laboral.

() Certa () Errada

Comentários

A candidíase relacionada ao trabalho poderá ser verificada em trabalhadores que exercem atividades que requerem longas imersões das mãos em água e irritação mecânica das mãos, tais como trabalhadores de limpeza, lavadeiras, cozinheiras, entre outros, com exposição ocupacional claramente caracterizada por meio de história laborativa e de inspeção em ambiente de trabalho. Nesses casos, a candidíase poderá ser considerada como doença relacionada ao trabalho, do Grupo II da Classificação de Schilling.

Reveja a classificação:

Classificação de Schilling

Utilizada para doenças ocupacionais. Em 1984, Richard Schilling agrupou as doenças ocupacionais em 3 grupos:

Schilling I: Doenças que têm o trabalho como causa necessária. Ex.: silicose.

Schilling II: Doenças que têm o trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Ex.: a maioria das doenças do grupo das "LER/DORTs".

Schilling III: Doenças que têm o trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doenças já estabelecidas. Ex.: dermatites de contato.

Alternativa: Certa.

36. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue o item a seguir.

Dada a natureza de indústrias de laticínios, abatedouros, açougues, frigoríficos, laboratórios e clínicas veterinárias, os trabalhadores que exercem suas funções nesses locais estão expostos ao risco de contrair brucelose.

() Certa () Errada

Comentários

A brucelose é uma infecção bacteriana que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Evitar os produtos lácteos não pasteurizados e tomar precauções quando se trabalha com animais ou em um laboratório pode ajudar a prevenir a doença.



Os sintomas podem incluir dores articulares e musculares, febre, perda de peso e fadiga. Algumas pessoas desenvolvem dor de barriga e tosse.

Alternativa: Certa.

37. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue o item a seguir.

A neoplasia maligna de bexiga, de etiologia multicausal, com alta malignidade e, em geral, com prognóstico de letalidade de três meses a seis meses, pode estar relacionada às atividades laborais.

() Certa () Errada

Comentários

O câncer de bexiga é o décimo mais incidente no mundo e apresenta uma sobrevida melhor do que o câncer do pulmão. A maioria dos casos ocorre em homens (70%) e os principais fatores de risco são o tabagismo e a exposição ocupacional e ambiental a determinados cancerígenos químicos.

A exposição ocupacional com risco de tumores malignos da bexiga pode existir em diversas atividades como, no trabalho na produção de alumínio, na gaseificação do carvão, na fundição de ferro e aço e piche de carvão e alcatrão, poeira de negro de fumo, trabalhadores expostos à emissão de gases de combustão de diesel cabeleireiros e barbeiros, trabalhadores da indústria da borracha e do plástico, dentre outros.

Alternativa: Certa.

38. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue o item subsequente.

A responsabilidade dos estabelecimentos de saúde que geram resíduos encerra-se assim que são contratadas empresas terceirizadas para realizar os serviços de limpeza, coleta, tratamento, disposição final e comercialização de materiais reciclados.

() Certa () Errada

Comentários

A empresa geradora de resíduos é responsável desde a geração do resíduo até a destinação final ou disposição final ambientalmente adequada. Portanto, não se isenta de responsabilidade em nenhuma etapa. Mesmo que seja contratada uma empresa terceirizada, continua sendo responsabilidade do gerador zelar pelo serviço prestado e se assegurar de que a empresa tem todas as licenças ambientais. Assim, o RSS continua sendo de responsabilidade do gerador, mesmo que exista uma empresa responsável pelo processamento dos resíduos.

Alternativa: Errada.



39. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue o item subsequente.

Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são classificados e separados em cinco grupos de acordo com suas características e tipo de risco, o que determina as formas como serão armazenados, coletados, transportados e entregues ao destino final.

() Certa () Errada

Comentários

São cinco grupos:

Risco A (risco biológico): que se subdivide em cinco;

- A1: bolsa de sangue, hemocomponentes, materiais de cultura e de manipulação genética.
- A 2: Carcaça animal ou peça com suspeita de contaminação.
- A 3: Peça animal ou de fecundação(abroto com feto <de 500 gr, <de 25 cm e < de 20 semanas gestacional), ambos sem solicitado por família;
- A 4: kits de linhas arteriais, endovenoso ou diálise, sobras de laboratório de fezes, urina, lipoaspiração.
- A 5: material contaminado príons.

Risco B: risco químico;

Risco C: risco radioativo;

Risco D: comum: papel higiênico, absorvente, fralda, equipo de soro, máscara, luvas sem sangue, abaixador de língua. Este se divide em orgânico e reciclável.

Risco E: perfuro cortante.

Alternativa: Certa.

40. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue o item subsequente.

A autoclave e o incinerador são equipamentos utilizados para a desinfecção de resíduos sólidos dos serviços de saúde do grupo B, de modo que eles possam ser posteriormente encaminhados ao circuito normal de coleta dos resíduos sólidos urbanos.

() Certa () Errada

Comentários

A autoclave é um equipamento utilizado para a esterilização de produtos utilizados em serviços de saúde.

Resíduos do grupo B são substâncias químicas que conferem risco à saúde pública ou ao meio ambiente dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Por esse motivo, precisam ser incinerados de modo que eles possam ser posteriormente encaminhados ao circuito de coleta dos resíduos sólidos urbanos.

Alternativa: Errada.



Gabarito

1. E	21.C
2. C	22.C
3. C	23.E
4. E	24.E
5. E	25.C
6. C	26.E
7. C	27.C
8. C	28.C
9. E	29.E
10.C	30.E
11.E	31.C
12.C	32.C
13.C	33.E
14.E	34.C
15.C	35.C
16.C	36.C
17.E	37.C
18.C	38.E
19.E	39.C
20.E	40.E

Lista de Questões

1. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue o item a seguir.

A vacina quadrivalente papilomavírus humano (HPV recombinante) deve ser administrada exclusivamente por via subcutânea, no esquema estendido zero, seis e sessenta meses, podendo o paciente que a tome apresentar reações como dor no local da aplicação, edema e eritema de intensidade moderada.

() Certa () Errada

2. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue o item a seguir. A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue o item a seguir.

Uma única dose da vacina contra a febre amarela, produzida com vírus vivo atenuado, pode conferir eficácia entre 90% a 98% e proteção por toda a vida.

() Certa () Errada



3. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca das modalidades assistenciais, julgue o item subsequente.

A modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares inclui procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, para o cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

() Certa () Errada

4. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca das modalidades assistenciais, julgue o item subsequente.

Define-se regime de hospital-dia como assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de vinte e quatro horas.

() Certa () Errada

5. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às unidades de atenção à saúde mental, julgue o item seguinte.

O centro de atenção psicossocial (CAPS) na modalidade II é o que atende crianças e adolescentes somente entre dez e dezessete anos de idade, portadores de transtornos mentais graves e persistentes, inclusive decorrentes do uso de substâncias psicoativas, em cidades e(ou) regiões com pelo menos cem mil habitantes.

() Certa () Errada

6. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às unidades de atenção à saúde mental, julgue o item seguinte.

Uma das diretrizes de serviço hospitalar de referência para a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas é a integração à rede de atenção psicossocial, para garantia da continuidade do cuidado.

() Certa () Errada

7. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Sabendo que a presença de incapacidades é o principal preditor de mortalidade, hospitalização e institucionalização em idosos, julgue o item a seguir, a respeito da assistência de enfermagem em gerontologia.

No planejamento de enfermagem, devem-se determinar os resultados que se desejam alcançar e as ações ou intervenções que deverão ser realizadas face às respostas da assistência prestada ao idoso, identificadas na etapa do diagnóstico de enfermagem.



() Certa () Errada

8. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Sabendo que a presença de incapacidades é o principal preditor de mortalidade, hospitalização e institucionalização em idosos, julgue o item a seguir, a respeito da assistência de enfermagem em gerontologia.

A avaliação das atividades da vida diária é a primeira fase da avaliação cognitiva do idoso.

() Certa () Errada

9. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico, julgue o item subsecutivo.

Flebite e urticária são efeitos colaterais comuns da quimioterapia sistêmica.

() Certa () Errada

10. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico, julgue o item subsecutivo.

Na terapia nutricional enteral em pacientes oncológicos, cabe ao profissional enfermeiro orientar os familiares e(ou) cuidadores quanto aos procedimentos relativos à higiene da ponta da sonda — com algodão embebido em álcool — a ser adotados antes de cada administração de dieta.

() Certa () Errada

11. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico, julgue o item subsecutivo.

Não há contraindicação de contato entre pacientes oncológicos em processo de quimioterapia e pessoas portadoras de doenças transmissíveis.

() Certa () Errada

12. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca de procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais vitais, julgue o item a seguir.

Com relação à frequência cardíaca, a ausência de pulso pode indicar uma oclusão arterial.

() Certa () Errada

13. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Acerca de procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais vitais, julgue o item a seguir.



A verificação da temperatura corpórea superficial/periférica por via oral é contraindicada em pacientes que tenham realizado cirurgias na região ou que apresentem dificuldade de respirar.

() Certa () Errada

14. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às recomendações de práticas seguras em cirurgia, julgue o item que se segue.

Uma mensuração inicial da concentração de gás carbônico expirado (capnografia) deve ser usada para confirmar o posicionamento correto de tubo oral e também a adequação dos agentes voláteis inspirados.

() Certa () Errada

15. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A demarcação da lateralidade deve ser feita no sítio operatório ou próximo a ele — sítios não operatórios não devem ser demarcados.

() Certa () Errada

16. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 mmHg e(ou) 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir.

O mecanismo mais comum da HA no idoso é o enrijecimento da parede arterial dos grandes vasos, que pode levar ao aumento predominante da pressão arterial sistólica, com manutenção ou queda da pressão arterial diastólica.

() Certa () Errada

17. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 mmHg e(ou) 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir.

A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) consiste no registro direto da pressão arterial durante doze horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e sono.

() Certa () Errada



18. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

Doenças diarreicas no primeiro ano de vida são comumente associadas a mamadeiras mal higienizadas e à ocorrência de contaminações de alimentos complementares.

() Certa () Errada

19. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

A frequência respiratória considerada normal para crianças de doze meses a cinco anos de idade é entre trinta e sessenta movimentos por minuto.

() Certa () Errada

20. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

A diarreia por rotavírus é prevenida por vacina aplicada aos doze meses de idade e aos quinze meses de idade.

() Certa () Errada

21. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária entre dois anos de idade e seis anos de idade se correlaciona com diarreia crônica e baixo crescimento.

() Certa () Errada

22. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a principal causa da síndrome do desconforto respiratório.

() Certa () Errada

23. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue o item a seguir.

Enquanto a proteção oferecida pelo leite materno contra mortes por infecções respiratórias diminui com a idade, a proteção desse alimento contra mortes por diarreia se mantém constante nos primeiros dois anos de vida.



Para resolver essa questão, é necessário que o aluno tenha conhecimento sobre doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças.

() Certa () Errada

24. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue o item que se segue.

Recomenda-se a realização de mamografia bianualmente para mulheres a partir dos quarenta anos de idade.

() Certa () Errada

25. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue o item que se segue.

Os sintomas de menopausa costumam ser mais severos em fumantes.

() Certa () Errada

26. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue o item que se segue.

Entre os maiores fatores de risco para osteoporose está a menopausa tardia.

() Certa () Errada

27. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida, julgue o próximo item.

() Certa () Errada

28. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida, julgue o próximo item.

Situações pré-hospitalares envolvendo violência, abuso de drogas ou intoxicações devem ser avaliadas pelo método ACENA.

O método ACENA é descrito no SAMU como uma avaliação de segurança para o socorrista a qual envolve a análise dos arredores, se a vítima está portando armas, a expectativa de vítima quanto ao atendimento, avaliação do nível de consciência, se há conflito e crise naquele ambiente e observação dos sinais de abuso de drogas e álcool, dentre outros aspectos.

() Certa () Errada



29. Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida, julgue o próximo item.

É obrigatória a aplicação da escala de Cincinati após manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

() Certa () Errada

30. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Julgue o item subsequente, considerando as normas brasileiras de acreditação de serviços de saúde.

Um fundamento atual da gestão em saúde é a gestão por processos, definida como forma de entender a organização como um sistema integrado, de áreas interdependentes.

() Certa () Errada

31. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Julgue o item subsequente, considerando as normas brasileiras de acreditação de serviços de saúde.

A avaliação de uma organização prestadora de serviços de saúde pode levar a um dos seguintes resultados: acreditado com excelência; acreditado pleno; acreditado; não acreditado.

() Certa () Errada

32. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco, julgue o item subsequente.

O descolamento prematuro de placenta em grau 1 compromete a vitalidade do feto.

() Certa () Errada

33. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco, julgue o item subsequente.

Casos de abortamento infectado são mais associados a ocorrências espontâneas, decorrentes da falta de higienização regular.

() Certa () Errada

34. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco, julgue o item subsequente. Casos de crescimento intrauterino restrito grave, diagnosticado no segundo trimestre de gravidez, sugerem possibilidades de cromossomopatia ou de infecção congênita.

() Certa () Errada



35. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue o item a seguir.

Em se tratando de funcionários que exercem atividades de limpeza, lavanderia e cozinha, considera-se a candidíase uma doença laboral caracterizada, por meio da história ocupacional dessas pessoas e da inspeção no ambiente de trabalho, a exposição laboral.

() Certa () Errada

36. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue o item a seguir.

Dada a natureza de indústrias de laticínios, abatedouros, açougues, frigoríficos, laboratórios e clínicas veterinárias, os trabalhadores que exercem suas funções nesses locais estão expostos ao risco de contrair brucelose.

() Certa () Errada

37. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue o item a seguir.

A neoplasia maligna de bexiga, de etiologia multicausal, com alta malignidade e, em geral, com prognóstico de letalidade de três meses a seis meses, pode estar relacionada às atividades laborais.

() Certa () Errada

38. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue o item subsequente.

A responsabilidade dos estabelecimentos de saúde que geram resíduos encerra-se assim que são contratadas empresas terceirizadas para realizar os serviços de limpeza, coleta, tratamento, disposição final e comercialização de materiais reciclados.

() Certa () Errada

39. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue o item subsequente.

Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são classificados e separados em cinco grupos de acordo com suas características e tipo de risco, o que determina as formas como serão armazenados, coletados, transportados e entregues ao destino final.

() Certa () Errada



40. CEBRASPE / Instituto Hospital Base do Distrito Federal / 2018 - Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue o item subsequente.

A autoclave e o incinerador são equipamentos utilizados para a desinfecção de resíduos sólidos dos serviços de saúde do grupo B, de modo que eles possam ser posteriormente encaminhados ao circuito normal de coleta dos resíduos sólidos urbanos.

() Certa () Errada



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.